ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/287646115

Tweekleurige vleermuis in braakbal van kerkuil

Article · January 2007

CITATIONS
0

READS
59

2 authors, including:

Dick L. Bekker
Detail 2.0 - Faunistical Research
40 PUBLICATIONS **150** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Dick L. Bekker on 21 December 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

TWEEKLEURIGE VLEERMUIS IN BRAAKBAL VAN KERKUIL

Rob Koelman & Dick Bekker

Bij het pluizen van een grote partij braakballen van de Kerkuil, verzameld tussen Akkrum en Vegelinsoord, trof één van de vaste 'pluizers' van de Zoogdiervereniging VZZ (Wiesje Spijkstra) een schedeltje van een vleermuis aan. Deze werd ter determinatie opgestuurd naar het kantoor van de VZZ. Vanwege het vrij forse formaat en het hoekige zijprofiel van de schedel werd in eerste instantie gedacht aan een Meervleermuis *Myotis dasycneme*. Bij nadere determinatie werd echter al gauw duidelijk dat het hier om een Tweekleurige vleermuis *Vespertilio murinus* moest gaan. Onder meer vanwege het formaat van de schedel, de aanwezigheid van slechts één premolaar in de bovenkaak en de vorm van de M3. Vanwege de zeldzaamheid van deze soort zijn foto's van het schedeltje naar diverse experts gestuurd, die de determinatie hebben bevestigd.

De aangetroffen schedel van de Tweekleurige vleermuis. *foto: Dick Bekker*

Over de precieze status van de Tweekleurige vleermuis in Nederland bestaat onduidelijkheid. Tot vrij recent gold de Tweekleurige vleermuis in ons land als een zeldzame doortrekker in najaar en winter. Uitzondering op dit beeld werd gevormd door een reeds enkele jaren aanwezige kraamgroep in de provincie Utrecht. De laatste jaren worden steeds vaker zomerwaarnemingen van de soort gemeld, onder meer uit Fryslân, Groningen, Flevoland en Overijssel. Het is daarbij niet duidelijk of de soort in Nederland daadwerkelijk toeneemt of dat deze in het verleden gemist is doordat de sonargeluiden werden verward met die van Laatvlieger *Eptesicus serotinus* of Rosse vleermuis *Nyctalus noctula*. Wat wel duidelijk is, is dat de Tweekleurige vleermuis momenteel nog altijd beslist geen algemene soort is. De vondst van een Tweekleurige vleermuis in een braakbal mag dan ook zeker een bijzondere gebeurtenis genoemd worden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het septembernummer van Zoogdier 18-3.

Rob Koelman & Dick Bekker, Zoogdiervereniging VZZ
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem
e-mail: rob.koelman@vzz.nl / dick.bekker@vzz.nl